

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PATIENTS

PRENANT JARDIANCE® (empagliflozin)

POUR TRAITER LE DIABÈTE DE TYPE 2

Jardiance®
(empagliflozin)

Ces informations vous ont été communiquées par votre médecin ou le personnel infirmier.

JARDIANCE est un médicament destiné à traiter le diabète de type 2 chez les adultes qui ne sont pas parvenus à obtenir une réponse suffisante par le régime alimentaire, l'activité physique ou d'autres médicaments.

Comment JARDIANCE agit-il ?

Dans le diabète de type 2, l'organisme accumule du sucre excédentaire en raison de l'effet d'une substance dans les reins appelée SGLT2.

- JARDIANCE bloque le SGLT2 de sorte que le sucre excédentaire (en moyenne 78 grammes/jour) soit excrété dans les urines. Cela facilite le contrôle de la glycémie.
- Si vous avez une maladie cardiovasculaire, JARDIANCE réduit le risque de nouveaux événements cardiovasculaires, comme les attaques cardiaques et l'accident vasculaire cérébral, ainsi que le risque de décès.
- JARDIANCE peut aussi entraîner une perte de poids (mais il ne s'agit pas d'un médicament destiné à être utilisé pour la perte de poids).



Dans le diabète de type 2, des taux élevés de sucre circulent dans le sang. JARDIANCE bloque le SGLT2, ce qui entraîne l'excrétion du sucre excédentaire dans les urines.

Sans traitement

Avec JARDIANCE

Le traitement est-il associé à des effets indésirables ?

Tous les médicaments peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les réactions médicamenteuses indésirables les plus fréquentes de JARDIANCE sont :

- Infection fongique génitale (rougeur, démangeaisons et irritation).
- Infection des voies urinaires (brûlure au moment d'uriner, urine trouble, fréquence urinaire accrue, douleurs pelviennes et/ou dorsales).

Ces effets indésirables sont plus fréquents chez les femmes et, dans la plupart des cas, sont légers ou modérés et ne réapparaissent que rarement après avoir été traités par un médecin.

- Une légère augmentation du besoin d'uriner est aussi un effet indésirable fréquent de JARDIANCE.

Lisez la notice pour en savoir plus sur les effets indésirables. Contactez systématiquement votre médecin si vous constatez des effets indésirables dus à votre traitement. Vous ne devez pas arrêter de prendre JARDIANCE sans en parler au préalable avec votre médecin.

Concernant l'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang anormalement bas)

JARDIANCE provoque rarement des taux de sucre dans le sang anormalement bas, bien qu'un traitement concomitant avec d'autres antidiabétiques (sulphonylurées ou insuline) risque de provoquer une hypoglycémie. Si vous présentez des symptômes tels que tremblements, sueurs, troubles de

Lisez la notice d'information du patient ou rendez-vous sur www.fass.se pour les informations complètes concernant JARDIANCE.

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PATIENTS

PRENANT JARDIANCE® (empagliflozin)

POUR TRAITER LE DIABÈTE DE TYPE 2



Ces informations vous ont été communiquées par votre médecin ou le personnel infirmier.

l'élocution, vertiges ou maux de têtes, il peut être utile de prendre un comprimé de dextrose, un verre de jus de fruit ou du lait. Reposez-vous quelques instants puis mangez quelque chose (un fruit ou un sandwich par exemple). Contactez impérativement votre médecin si les symptômes ne disparaissent pas ou s'aggravent.

À propos de l'acidocétose diabétique

L'acidocétose diabétique (ACD) est une affection grave survenue dans de rares cas durant le traitement par des inhibiteurs du SGLT2 comme JARDIANCE. L'ACD est provoquée par du sang trop acide (faible pH) et peut entraîner des symptômes tels que perte de poids rapide, nausées ou vomissements, douleurs abdominales, soif excessive, respiration rapide et profonde, confusion, fatigue anormale, haleine fruitée, goût sucré ou métallique dans la bouche et changement d'odeur de l'urine ou de la transpiration.

Si vous constatez l'un de ces symptômes, contactez immédiatement votre médecin ou l'hôpital le plus proche, même si votre glycémie n'est pas particulièrement élevée. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement en urgence et vos médicaments anti-diabétiques pourraient devoir être changés.

En cas de doute, appelez le personnel infirmier en charge de votre diabète, votre médecin ou le 1177.

Comment prendre JARDIANCE

- Prenez un comprimé une fois par jour avec ou sans nourriture.
- Si vous oubliez de prendre un comprimé :
 - Prenez-le dès que possible si vous êtes à 12 heures ou plus de la dose suivante.
 - Ne le prenez pas si vous êtes à moins de 12 heures de la dose suivante.
 - Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
- Ne prenez jamais deux comprimés pour compenser une dose oubliée !
- Pour vous aider à vous rappeler de prendre votre médicament, prenez-le à la même heure chaque jour, par exemple au moment du petit déjeuner ou lorsque vous vous brossez les dents.



Prenez un comprimé par jour ...



... à l'horaire qui vous convient ...



... avec ou sans nourriture

Lisez la notice d'information du patient ou rendez-vous sur www.fass.se pour les informations complètes concernant JARDIANCE.

JARDIANCE (empagliflozin), 10 mg and 25 mg film-coated tablets. Your doctor has prescribed this medication to lower your blood sugar and to decrease the risk of certain cardiovascular diseases. Jardiance is used to treat type 2 diabetes in adult patients (age 18 or older). Jardiance is used if your diabetes cannot be controlled with diet and exercise, or with other anti-diabetic medications. Jardiance can be used alone if metformin is not tolerated, or together with other drugs for treatment of diabetes. It is important that you continue with the diet and exercise program recommended by your doctor, pharmacy staff or nurse. Do not use Jardiance if you are allergic to empagliflozin or any other ingredient contained in this medicine. Talk to your doctor before you start taking Jardiance if you have symptoms of any of these conditions: type 1 diabetes, elevated level of ketone bodies in the urine or blood, serious kidney problems, extremely high blood glucose levels, if you are age 75 or older, if you feel ill or have a fever or are unable to eat or drink, if you have a serious urinary tract or kidney infection accompanied by fever. If you are age 85 or older you should not start taking Jardiance. Always read the package insert. Boehringer Ingelheim AB. Box 47608, 117 49 Stockholm. Tel +46 (0)8-721 21 00. This information is based on package insert 01/2018.

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring, which will make it possible to quickly identify new safety information. You can help by reporting any side effects that you may experience.